

1-Résumé des Caractéristiques du Produit

FLUB 100 mg Flubendazole

- Laboratoire ou entreprise titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché : UNIPHARMA co.
- Nom du Produit : FLUB 100 mg
- Dénomination Commune Internationale : Flubendazole.
- Forme Pharmaco-thérapeutique et présentation : Comprimé ; boîte de 6.
- Classe Pharmaco-thérapeutique : Antiparasitaire anthelminthique.

Composition :

- Flubendazole..... 100 mg

Excipients : Corn starch, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, talc, Lactose monohydraté, aérosil

Propriétés:

- Flubendazole est du 5- (P-fluorobenzoyl)-Benzimidazole carbamate
- Son poids moléculaire est 313,29
- Le Flubendazole gêne la formation intracellulaire des tubulines chez les vers conduisant ainsi à une perturbation dans la fixation du glucose et les fonctions digestives normales du vers qui mène à un processus autolytique.
- Flub est mal absorbé à partir du tube digestif, sa biodisponibilité est mauvaise d'une part à cause de son métabolisme «de premier passage » élevé et d'autre part à cause de la très lente solubilité du médicament. Ainsi, Flub est sans danger pour le corps humain.

Indications :

Flub est indiqué dans le traitement d'infestations par un ou plusieurs types de vers :

- Ascariidiose.
- Ankylostomiase.
- Oxyurose.
- Trichocéphalose

Contre-indications:

- Hypersensibilité au Flubendazole ou à l'un des composants.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Effets secondaires :

Des effets secondaires très mineurs liés à la l'absorption de Flub ont été signalés. Des douleurs abdominales passagères, des diarrhées surviennent en particulier dans les cas d'infestations massives. De très rares cas de réactions d'hypersensibilité tels que les rashes, les urticaires et les œdèmes angioneurotiques ont été signalés.

Précautions :

Grossesse et allaitement :

Il n'y a pas suffisamment de données sur l'utilisation et la bonne tolérance de Flubendazole dans les populations suivantes :

- Femmes enceintes et allaitantes
- Néanmoins prévenez votre médecin ou votre pharmacien en cas de grossesse ou d'allaitement.

Posologie et mode d'administration :

Identique pour les adultes et les enfants.

Aucune précaution d'emploi n'a été retenue ; en particulier ni purge ni jeûne préalables ne sont nécessaires (aucun interdit de nourriture et de boisson).

Les comprimés peuvent être pris avec un peu d'eau ou peuvent être croqués pendant les repas.

- 1 - Oxyurose :
1 comprimé en dose unique.

Il est recommandé de répéter la dose après 15 à 20 jours pour diminuer le taux de récurrence.

- 2 - Ascaridiose, Trichocéphalose, ankylostomose, et infestation Mixte :
1 comprimé matin et soir par jour pendant 3 jours consécutifs.

Surdosage :

En cas de surdosage accidentel de FLUB, consulter immédiatement votre médecin, par mesure de sécurité.

Conservation :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur la boîte même si le médicament a été conservé dans les conditions recommandées.

Conservez FLUB entre 15°C et 30°C.

Condition de délivrance : Liste II.

A.C. Spécialité

Dr. Amr Al...

UNI PHARMA
Universal industrial pharmaceutical Co.
Research & development Dept.
Conforms.